아만타딘황산염 단일제(정제) 허가사항 변경대비표

항목	기 허가사항	변경사항
효능.효과	1. 파킨슨증후군 2. 인플루엔자 A형 바이러스에 의한 호흡기 감염증의 예방 및 치료	파킨슨증후군 <삭제>
용법.용량	1. 파킨슨증후군 ○ 성인 황산아만타딘으로서 1회 100mg 1일 2회 경구투여한다. 중증의 내과 질환 환자 또는 다른 항파킨슨제를 투여하는 환자는 초기량으로 1일 1회 100mg을 투여하고 1 - 수 주후에 유지량으로 1회 100mg 1일 2회 투여한다. 의사의 지시하에 증량하여 투여할 수 있으나 1일 400 mg을 초과하지 않는다. ○ 고령자 1일 1회 100mg을 초과하지 않는다. 2. 인플루엔자의 예방 및 치료 ○ 성인 이 약으로서 1일 200mg을 1-2회 분할투여한다. ○ 고령자 1일 1회 100mg을 초과하지 않는다.	○ 성인 아만타딘황산염으로서 1회 100mg 1일 2회 경구투여한다. 중증의 내과 질환 환자 또는 다른 항파킨슨제를 투여하는 환자는 초기량으로 1일 1회 100mg을 투여하고 1 - 수 주후에 유지량으로 1회 100mg 1일 2회 투여한다. 의사의 지시하에 증량하여 투여할 수 있으나 1일 400 mg을 초과하지 않는다. ○ 고령자 1일 1회 100mg을 초과하지 않는다. <삭제>

	○ 1-9세 소아 1일 체중 kg당 4-8mg을 분할투여한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.	