

일반의약품
분류번호 263

화상·상처치유제

비아핀® 에멀전

트 롤 아 민

Biafine®은 O/W형의 에멀전으로서 심투와 모세관의 원리에 의해 상처부위의 청정작용과 배농작용의 2가지 독특한 효과를 나타내어 상처의 치유과정에 가장 적합한 수분환경을 유지시키고, 상처부위의 미소순환을 촉진하므로 방사선화상·일광화상·창상·수술 등으로 인한 피부상처의 치유에 매우 효과적인 약물입니다.

■ 원료약품의 분량 : 이 약 1g 중

- 유효성분 : 트롤아민(EF) 6,7mg
- 첨가제(보존제) : 소르빈산칼륨 1,34mg
파라옥시벤조산메틸나트륨 1,0mg
파라옥시벤조산프로필나트륨 0,5mg
- 기타 첨가제 : 에틸렌글리콜모노스테아레이트, 스테아르산, 팔미틴산세틸, 고행파라핀, 정질유, 동파라핀, 스쿠알란, 아보카두유, 프로필렌글리콜, 트롤아민알긴산나트륨, 에르바톤향, 정제수

■ 성상 : 특이한 향이 있는 전질균등한 백색의 부드러운 크림제

■ 효능 · 효과

1. 1도, 2도 화상 및 기타 비감염성 피부상처
2. 방사선 치료에 의한 2차적 홍반(붉은반점)

■ 용법 · 용량

1. 1도 화상 : 1일 2~4회 약물이 더 이상 흡수되지 않을 때까지 두껍게 바른 후 부드럽게 마사지 한다.
2. 2도 화상, 기타 비감염성 피부상처 : 일반적으로 상처부위와 그 주위에 약물을 두껍게 바르고 항상 상처부위에 약물이 과량 존재하도록 반복해서 바른다. 드레싱이 필요한 경우에는 이 약을 두껍게 바른 후(약 0.5cm두께로) 축축한 무균패드를 덮고 드레싱을 끈다(간조한 드레싱은 약물로부터 수분을 흡수하여 상처를 손상시키므로 사용하지 않도록 주의한다).
3. 방사선 치료에 의한 2차적 홍반(붉은반점) : 일정한 간격을 두고 1일 2~3회 방사선을 조사할 부위와 주위에 약물을 두껍게 바르고 부드럽게 마사지한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자(부위)에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약 또는 이 약 성분에 과민증 및 그 병력이 있는 환자
- 2) 약물이나 음식 알레르기예 의한 피부염 환자
- 3) 출혈성·감염성 피부상처 부위
- 4) 감염 부위
- 5) 이식을 행하기 전의 피부이식 부위

2. 부작용

중등도의 일시적인 따끔따끔한 느낌, 드물게 접촉성알레르기가 나타날 수 있다.

3. 일반적 주의

- 1) 이 약은 살균제를 함유하지 않으므로 상처부위를 청결하게 유지한다.
- 2) 정해진 용법·용량을 지킨다.

4. 적용상의 주의

- 1) 안과용으로 사용하지 않는다. 만일 눈에 들어간 경우에는 물로 씻고 즉시 안과 전문의의 진료를 받는다.
- 2) 이 약은 일광차단제를 함유하지 않으므로 일광화상(햇볕화상) 방지로용으로 사용하지 않는다.

5. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

이 약은 프리필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자는 신중히 투여한다.

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온보관(1~30℃). (사용기간 : 36개월)

■ 포장단위 : 46.5g/튜브

■ 첨부문서 최종개정일 : 2018년 12월 19일

※ 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 부작용 피해구제 신청 : 한국 의약품안전관리원(1644-6223)

19-1-6

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 ※ 사용전에 첨부문서를 꼭 읽으십시오.
 ※ 기타 문의사항은 의·약사와 상의하거나 당사의 소비자 상담실 080-529-6100로 문의하십시오.
 ※ 첨부문서 최종 개정일 이후의 변경사항은 <http://www.nicepharma.com>에서 확인하실 수 있습니다.

제조사

JANSSEN CILAG S.A
Domaine de Maigremont, 27100 Val de Reuil, France

수입자

 **고려제약주식회사**
경기도 이천시 신둔면 원적로 69-10