

지친 간장에 활력을!

일반의약품
분류번호 391

실리톤 연질캡슐

밀크시슬열매건조엑스

■ 원료약품 및 그 분량 : 이 약 1캡슐 중

유효성분 : 밀크시슬열매건조엑스(생규) 350mg

첨가제(타르색소) : 적색40호, 청색1호, 황색203호

첨가제(동물유래성분) : 백납(꿀벌의 집), 숙신산젤라틴(소의 가죽)

기타 첨가제 : 콩기름, 경화유, 레시틴, 농글리세린, 소르비톨액(비결정성), 에틸바닐린, 산화티탄, 카르나우바납, 중쇄트리글리세리드

■ 성상

황갈색의 유상 내용물을 함유한 녹색의 장방형 연질캡슐제

■ 효능·효과

다음 질환의 보조치료 : 독성간질환, 만성간염, 간경변

■ 용법·용량

성인 1일 1회, 1회 1캡슐 복용

■ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 심한 담도 폐쇄 환자
- 2) 이 약의 과민증 환자
- 3) 12세 이하의 소아
- 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유체를 신중히 투여해야 하는 환자

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

임신, 수유부

4. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

상당시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 드물게 위통 또는 설사
- 2) 알레르기 반응

5. 이 약의 복용시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 지킬 것.
- 2) 황달의 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것.
- 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우나 장기복용시에는 의사 또는 약사와 상의할 것.

6. 일반적 주의

지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관할 것.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■ **저장방법** : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 (사용기간 : 제조일로부터 24개월)

■ **포장단위** : 60캡슐(10캡슐/PTP×6), 120캡슐[(10캡슐/PTP×6)×2]

■ **첨부문서 최종 개정일** : 2019년 4월 24일

■ **제조의뢰자** : 고려제약(주) 경기도 이천시 신둔면 원적로 69-10

■ **제조사** : (주)서흥 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61

※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ **부작용 보고 및 피해구제 신청** : 한국약품안전관리원(1644-6223)

20-5-18-E

- ※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ※ 사용전에 첨부문서를 꼭 읽으십시오.
- ※ 기타 문의사항은 의·약사와 상의하거나 당사의 소비자 상담실 080-529-6100로 문의하십시오.
- ※ 첨부문서 최종 개정일 이후의 변경사항은 <http://www.nicepharma.com>에서 확인하실 수 있습니다.



고려제약주식회사

경기도 이천시 신둔면 원적로 69-10