일반의약품 분류번호 269

여드름에 톡을 뾰루지에 톡을



■ **원료약품 및 그 분량** : 이 약 1g 중

· 첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸 1mg

· 기타 첨가제: 에탄올, 유동파라핀, 카보머 940, 트롤아민, 스테아릴알코올, 농글리세린, 프로필렌글리콜, 스쿠알란, 폴리소르베이트 60, 소르비탄스테아레이트, 정제수

■ 성상: 흰색 내지 연한 노란색의 크림제

■ **효능 · 효과** : 여드름, 뾰루지

■ 용법·용량: 1일 수 회, 비누 등으로 세안 후 적당량을 환부에 바른다.

■ 사용상의 주의사항

- 1, 다음 환자(부위)에는 사용하지 말 것
 - 1) 이 약에 과민증 또는 그 병력이 있는 환자
 - 2) 눈, 눈 주위
- 2. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 사람
 - 2) 약물 또는 화장품 등에 의해 알레르기 증상의 병력이 있는 환자
 - 3) 습윤이나 진무름이 심한 사람
 - 4) 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 국소적인 피부자극감(예: 발진(충혈되어 붉어짐), 가려움, 건조, 작열감(화끈감))
 - 2) 증상의 개선이 나타나지 않을 경우에는 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
- 4. 기타 이 약의 사용 시 주의할 사항
 - 1) 여드름, 뾰루지가 있는 부분에만 사용하고 주변의 넓은 부분이나 눈 주위에는 사용하지 않는다.
 - 2) 눈에 들어가지 않도록 주의한다. 만일, 눈에 들어간 경우에는 즉시 물 또는 미지근한 물로 씻어준다. 지극이 지속되는 경우 의사 또는 약사와 상의한다.
 - 3) 이 약은 외용으로만 사용하고, 이 약의 정해진 용법 · 용량을 잘 지킨다.
 - 4) 적용부위 이외의 피부에 닿지 않도록 주의한다.
 - 5) 실수로 이 약을 복용한 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
 - 6) 광범위 병소에 적용하는 경우에는 부작용이 나타나기 쉬우므로 주의하여 사용한다.
- 5. 저장상의 주의사항
 - 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 직사일광을 피하고 가능한 한 서늘한 곳에 마개를 닫아 보관한다.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.
 - 4) 사용기한을 넘긴 제품은 사용하지 않는다.
- 저장방법: 기밀용기, 차광실온(1~30℃)보관, (사용기간: 제조일로부터 24개월)
- 포장단위: 13g/튜브, 15g/튜브
- 제조의뢰자: 고려제약(주) 경기도 이천시 신둔면 원적로 69-10
- 제조자: 시믹씨엠오코리아주식회사 경기도 부천시 옥산로 230번길 23
- **첨부문서 최종 개정일 :** 2019년 05월 08일
- ※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- ※ 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

19-5-10

- ※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ※ 사용전에 첨부문서를 꼭 읽으십시오.
- ※ 기타 문의사항은 의·약시와 상의하거나 당사의 소비자 상담실 080-529-6100로 문의하십시오
- ※ 첨부문서 최종 개정일 이후의 변경 사항은 http://www.nicepharma.com에서 확인하실 수 있습니다.

