

# 티로케어<sup>®</sup>

일반의약품  
분류번호 629

「티로트린 겔」

■ 원료약품 및 그 분량 : 이 약 1g 중

유효성분 : 티로트린신(KP) ..... 1mg(역가)

첨가제(보존제) : 세틸피리다늄염화물수화물 0.5mg

기타 첨가제 : 카보머 934, 프로필렌글리콜, 트로메타민, 에탄올, 정제수

■ 성상 : 무색의 투명한 겔

■ 효능·효과

티로트린신 감수성 균에 감염된 외상(예, 찰과상), 굼은 피부감염의 개선

■ 용법·용량

감염된 부위에 1일 2~3회 적당량을 바른다.

가벼운 상처나 점막 부위의 감염에는 드레싱이 필요하지 않다. 심한 삼출성 상처에는 드레싱이 권장되며 이 약을 1~2회 사용시마다 드레싱을 교체하는 것이 권장된다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람(신체 부위)에는 이 약을 사용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응의 병력이 있는 환자
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
- 3) 코점막 부위

2. 이 약을 사용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.

- 1) 이 약의 주성분과 보존제가 모두 증으로 분비되는지에 대하여 알려져 있지 않으므로 이 약을 사용하는 동안 수유하지 않거나 수유하는 동안 이 약을 사용하지 않는다.
- 2) 눈에 직접 닿으면 화끈감이 나타날 수 있으므로, 눈 주위에 사용할 경우 이 약이 눈에 직접 닿지 않도록 주의한다.

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.

상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 매우 드물게 피부 화끈감 등의 과민반응
- 2) 이 약을 사용한 후 증상이 악화되거나, 일주일 이상 사용하여도 증상의 개선이 없는 경우

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 오·남용(잘못사용하거나 많이 사용)을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.
- 3) 제품 개봉 후 3개월 이내에 사용할 것.

■ 저장방법 : 기밀용기, 25℃ 이하 보관 (유효기간 : 제조일로부터 36개월)

■ 포장단위 : 10g/튜브

■ 첨부문서 최종 개정일 : 2020년 08월 25일

■ 제조자 : 시믹씨엠오코리아(주) 경기도 부천시 옥산로 230번길 23

■ 제조의뢰자 : 고려제약(주) 경기도 이천시 신둔면 원적로 69-10

※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다.

만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국약물안전관리원(1644-6223)

20-9-17-C

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

※ 사용전에 첨부문서를 꼭 읽으십시오.

※ 기타 문의사항은 의·약사와 상의하거나 당사의 소비자 상담실 080-529-6100로 문의하십시오.

※ 첨부문서 최종 개정일 이후의 변경사항은 <http://www.nicepharma.com>에서 확인하실 수 있습니다.



**고려제약주식회사**

경기도 이천시 신둔면 원적로 69-10