

고단위 처방의 잇몸질환 치료제

일반의약품  
분류번호 231

# 덴타포스 캡슐

■ 원료약품 및 그 분량 : 이 약 1캡슐 중

유효성분 : 리소짐염산염(KP) .....	30mg(역가)
제피아스코르브산(별규) .....	153.85mg(아스코르브산으로서 150mg)
토코페롤아세테이트2배산(KP) .....	10mg(토코페롤아세테이트로서 5U)
카르바조크롬(KP) .....	2mg

첨가제(타르색소) : 적색3호, 청색호, 황색203호

첨가제(동물유래성분) : 리소짐염산염(닭의 난백), 젤라틴(돼지의 피부), 유당수화물(소의 우유), 스테아르산마그네슘(소의 기름)  
기타 첨가제 : 히드록시프로필셀룰로오스, 미결정셀룰로오스, 크로스포비돈, 경질무수규산, 탈크, 캡슐

■ 성상 : 주황색 및 흰색의 분말이 들어있는 상·하부 갈색의 경질캡슐제

■ 효능·효과 : 치주치료 후 치은염, 경·중등도 치주염의 보조치료

■ 용법·용량 : 성인 1회 1캡슐, 1일 3회 식후에 복용한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 15세 미만의 소아
- 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당) 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 약 및 화장품 등으로 알레르기 증상(발진, 발적, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 사람
- 2) 다른 약물을 복용하고 있는 환자
- 3) 지금까지 약이나 달걀에 알레르기 증상(예를 들면, 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 사람
- 4) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
- 5) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 꼭중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
- 1) 이 약 복용 후 발진, 발적, 설사, 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 구내염 등이 나타난 경우
  - 2) 피부 : 피부점막만중후군(스티븐스-존슨 증후군), 독성표피괴사용해(리엘중후군)가 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 발열, 홍반, 가려움, 안종혈, 구내염 등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는, 발진·발적, 화상모양의 수종 등의 중증의 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우
  - 3) 1개월 이상 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 장기간 계속하여 사용하지 말 것.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■ 저장방법 : 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관 (사용기간 : 제조일로부터 36개월)

■ 포장단위 : 10캡슐/PTP, 100캡슐/상자(10캡슐/PTP×10)

■ 첨부문서 최종 개정일 : 2021년 01월 13일

※ 본 의약품은 우수약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 의품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223)

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.  
 ※ 사용전에 첨부문서를 꼭 읽으십시오.  
 ※ 기타 문의사항은 의·약사와 상의하거나 당사의 소비자 상담실 080-529-6100로 문의하십시오.  
 ※ 첨부문서 최종 개정일 이후의 변경사항은 <http://www.nicepharma.com>에서 확인하실 수 있습니다.

21-3-2-C



**고려제약주식회사**  
경기도 이천시 신둔면 원적로 69-10