



일반의약품
분류번호 266

■ 원료약품 및 그 분량 : 이 약 100g 중

유효성분 : 살리실산(EP)	14g
락트산(EP)	4.6g
기타 첨가제 : 마크로글리우릴에테르(폴리도카놀), 시트르산트리에틸, 에틸셀룰로오스, 아세톤	

■ 성상 : 아세톤 냄새가 나는 미황색(연노랑)의 점성이 있는 액체

■ 효능·효과 : 타는, 굳은살, 사마귀

■ 용법·용량

1일 1~3회 환부(질환 부위)에 바른다.

이 약을 사용시 질환부위에 하얀 필름층이 형성될 수 있다. 재 적용시 이를 문지르거나 벗겨내어 제거하고 사용한다. 3~4일간 사용한 후 더운 물에 환부(질환 부위)를 담가 부드럽워진 각질을 벗겨낸다. 이 약의 1일 최대 사용량은 2g이며 1주일 이상 사용하지 않도록 한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 이 약은 다음의 신체 부위에는 사용하지 말 것

얼굴, 여성의 생식기, 눈 주위, 점막 등

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것

- (1) 살리실산, 젖산에 과민반응이 있는 경우
- (2) 유·소아
- (3) 신장에 환자
- (4) 정기적으로 피부의 넓은 영역을 치료해야 하는 수유부
- (5) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

상당시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것

- (1) 매우 드물게(10,000명 중 1명 이하) 다음과 같은 부작용이 보고되었다. : 피부의 과민반응(알러지성 접촉 피부염), 피부 표면의 작은 혈관의 돌출(모세 혈관 확장증), 갈색 반점, 햇빛에 노출된 이후에 나타나는 피부 반응(감광성), 피부의 염증(피부염)의 확장, 상단 피부 층의 박막화, 색소 침착, 탈색
- (2) 과도한 자극이 있는 경우 치료를 일시적으로 중단한다.

4. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항

- (1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
- (2) 수회 투여 후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
- (3) 이 약은 외용으로만 사용하고 내복하지 않는다.
- (4) 이 약이 환부 주위의 정상 피부에 묻지 않도록 주의하여 사용한다.
- (5) 눈에 들어가지 않도록 주의한다. 만일 눈에 들어간 경우에는 즉시 물로 씻는다. 증상이 심할 경우에는 안과 의사의 치료를 받는다.
- (6) 살리실산은 국소적으로 피부의 타액물에 대한 흡수율을 증가시킬 수 있으며, 흡수된 살리실산은 메토트렉세이트의 배설을 지연시키고, 설포닐우레아의 효과를 증가시킬 수 있다.
- (7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 투여하지 않는다 (살리실산이 흡수되어 중독을 일으킬 수 있다).
- (8) 수유부의 가슴에는 사용하지 않는다. 정기적으로 넓은 부위에 사용해야 하는 경우, 의사는 신생아의 해독 능력 부족으로 인한 위험성을 배제하기 위하여 사용을 조기중단 할 수 있다.
- (9) 다른 약물을 사용하기 전에 의사 또는 약사와 상의한다.

5. 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- (2) 실온(1~25℃)에 보관한다.
- (3) 화기에 가까이하지 않는다.
- (4) 직사일광을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관한다.
- (5) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.
- (6) 사용 후에는 뚜껑을 꼭 닫고, 용액이 굳어서 열기 힘든 증상을 막기 위하여 병 입구에 용액이 남아있는지 확인한다.

- **저장방법** : 차광기밀용기, 실온(1~25℃)보관 (사용기간 : 제조일로부터 36개월)
- **포장단위** : 10mL/병
- **첨부문서 최종 개정일** : 2021년 2월 25일
- **제조사** : (주)퍼센 충청남도 천안시 서북구 백석공단 1로 47
- **제조외뢰자** : 고려제약(주) 경기도 이천시 신둔면 원적로 69-10

- ※ 본 의약품은 우수약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- ※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(644-6223)

21-3-2-C

- ※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ※ 사용전에 첨부문서를 꼭 읽으십시오.
- ※ 기타 문의사항은 의·약사와 상의하거나
당사의 소비자 상담실 080-529-6100로 문의하십시오.
- ※ 첨부문서 최종 개정일 이후의 변경사항은
<http://www.nicepharma.com>에서 확인하실 수 있습니다.
- ※ 이 약은 외용제로만 사용하십시오.

화기엄금

용매가 휘발하여 제품이 굳을 수 있으니
사용후 즉시 뚜껑을 꼭 닫아 보관하십시오.



고려제약주식회사
경기도 이천시 신둔면 원적로 69-10