

무좀 · 완선 · 백선

일반의약품  
분류번호 265

# 터비나 플러스 크림

■ 원료약품 및 그 분량 : 이 약 1g 중

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 유효성분 : 테르비나핀염산염(JP) ..... | 10mg |
| 크로타미톤(USP) .....          | 50mg |
| L-멘톨(KP) .....            | 20mg |
| 에녹솔론(EP) .....            | 5mg  |
| 우레아(KP) .....             | 50mg |

첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸 1.5mg, 파라옥시벤조산프로필 0.5mg

기타 첨가제 : 백색바세린, 미리스티산이소프로필, 프로필렌글리콜, 디메티콘, 세탄올, 스테아릴알코올, 소르비탄 스테아레이트, 폴리소르베이트60, 잔탄검, 트롤라민, 시트르산수화물, 인산수소나트륨수화물, 부틸 히드록시톨루엔, 정제수

■ 성상

흰색 내지 미황색의 크림제

■ 효능 · 효과

피부사상균에 의한 피부진균(곰팡이)감염증 : 무좀, 완선(사타구니 백선), 백선

■ 용법 · 용량

1일 1회, 적정량을 환부(질환 부위)에 도포한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.

- 1) 이 약 성분에 의한 과민증(발진 및 부적, 가려움, 붓기 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부
- 3) 유 · 소아

2. 다음 부위에는 사용하지 말 것.

- 1) 눈이나 눈 주위, 점막(구강(입안), 비강(코안), 질 등), 음낭, 외음부 등
- 2) 습진
- 3) 습윤(습기 참), 짓무름, 갈라짐이나 외상(상처)이 심한 환부(질환부위)
- 4) 손톱, 두피

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

4. 이 약을 사용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.

이 약은 모유로 분비되므로, 이 약을 투여중인 수유부는 수유를 중단한다.

5. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 본인 또는 가족이 알레르기체질인 사람
- 3) 약에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람
- 4) 환부(질환 부위)가 안면(얼굴) 또는 광범위한 사람
- 5) 환부(질환 부위)가 화농(푼물)으로 되어 있는 사람
- 6) "습진"인지 "무좀, 완선(사타구니 백선), 백선"인지 확실하지 않은 사람  
(음낭에 가려움 및 짓무름 등의 증상이 있는 경우는 습진 등의 다른 원인에 의한 경우가 많다.)

6. 다음의 경우는 즉시 사용을 중지하고, 이 설명서와 함께 의사 또는 약사와 상담할 것.

1) 사용 후 다음과 같은 증상이 나타난 경우

| 관계부위 | 증상                                                                                                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 피부   | 발진 및 발적(총혈 되어 붉어짐), 가려움, 붓기, 자극감, 열감, 인비늘, 낙설(비듬이나 대와 같은 피부의 벗겨짐), 짓무름, 피부건조 및 피부가 당겨지는 느낌, 피부의 갈라짐 |

2) 2주일 정도 사용하여도 증상이 좋아지지 않는 경우나 본 약제의 사용에 의해 증상이 악화된 경우

7. 기타 이 약의 사용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법 및 용량을 엄수할 것.
- 2) 환부(질환부위)나 그 주위가 더러워진 채로 사용하지 말 것.
- 3) 본 약제가 묻은 손으로 눈이나 점막을 만지지 말 것.
- 4) 눈에 들어가지 않도록 주의할 것. 만일, 눈에 들어간 경우에는 즉시 찬 물 또는 미지근한 물로 씻어내고, 즉시 안과의의 진료를 받을 것.
- 5) 이 약은 외용에만 사용할 것.
- 6) 테르비나핀염산염 크림제는 모르로트를 대상으로 한 동물실험에서 약한 광독성이 나타났다는 보고가 있다.

8. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선이 닿지 않는 서늘한 곳에 밀봉하여 보관할 것.
- 2) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 3) 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.(오용(잘못 사용)의 원인이 되거나 품질이 바뀌는 경우가 있다.)
- 4) 사용기한이 지난 제품은 사용하지 말 것. 그리고 사용기한 내이더라도 개봉 후에는 최대한 빨리 사용할 것. (품질유지를 위해)

- **저장방법** : 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관
- **사용기간** : 제조일로부터 36개월
- **포장단위** : 30g/튜브
- **첨부문서 최종개정일** : 2021년 03월 09일
- **제조사** : (주)제뉴원사이언스 세종특별자치시 전의면 산단길 245
- **제조외파자** : 고려제약(주) 경기도 이천시 신둔면 원적로 69-10

**〈보관 시 주의사항〉**  
 여름철 차량 내부처럼 온도가 30℃ 이상 상승하는 장소에 보관 시 용기가 팽창할 수 있으니 직사광선 등을 피해 보관에 주의하십시오.

- ※ 본 의약품은 우수약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- ※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223)

21-3-19-C

- ※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ※ 사용전에 첨부문서를 꼭 읽으십시오.
- ※ 기타 문의사항은 의·약사와 상의하거나 당사의 소비자 상담실 080-529-6100로 문의하십시오.
- ※ 첨부문서 최종 개정일 이후의 변경사항은 <http://www.nicepharma.com>에서 확인하실 수 있습니다.