

효과 빠른 복합 진경제 스파메드정

일반의약품
분류번호 124

■ 원료약품 및 그 분량 : 이 약 1정 중

유효성분 : 디시클로민염산염(USP) 5mg
파파베린염산염(USP) 15mg

첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소의 우유)

기타 첨가제 : 마이크로셀락100, 미결정셀룰로오스, 크로스포비돈, 푸마르산스테아릴나트륨, 스테아르산

■ 성상 : 흰색의 원형 정제

■ 효능 · 효과 : 위통, 복통, 산통, 위산과다, 속쓰림

■ 용법 · 용량

성인(만 15세 이상) : 1회 2정 1일 2~3회, 만 8세 이상~만 15세 미만 : 1회 1정 1일 2~3회 식후 또는 식간에 복용한다.

다만, 1일 2회 이상 복용 시에는 4시간 이상의 간격을 두고 복용한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

(1) 만 7세 이하의 어린이

(2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

스코폴리아 엑스 함유 제제 및 다른 위장 진통·진경제

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

(1) 약으로 알레르기 증상(발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 사람

(2) 심장장애 환자, 녹내장(눈의 통증, 눈의 침침함 등) 또는 배뇨장애 환자, 허약자 또는 고령자

(3) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성

(4) 다른 약물을 복용하고 있는 사람

4. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

상당 시 이 첨부문서를 소지할 것.

(1) 이 약을 복용함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움 등)이 나타날 경우

(2) 이 약을 복용함으로써 구갈, 변비의 증상이 나타날 수 있다. 또 두통, 안면홍조, 눈부심, 배뇨장애 등이 나타날 경우

(3) 여러차례 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

(1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것

(2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여할 것.

(3) 이 약을 복용함으로써 시야몽롱, 눈부심 등이 나타날 수 있으므로 자동차운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의할 것.

6. 저장상의 주의사항

(1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

(2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.

(3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

■ 저장방법 : 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관 (사용기간 : 제조일로부터 36개월)

■ 포장단위 : 20정/PTP

■ 첨부문서 최종 개정일 : 2020년 12월 22일

※ 본 의약품은 우수약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223)

23-9-21-C

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

※ 사용전에 첨부문서를 꼭 읽으십시오.

※ 기타 문의사항은 의·약사와 상의하거나 당사의 소비자 상담실 080-529-6100로 문의하십시오.

※ 첨부문서 최종 개정일 이후의 변경사항은 <http://www.nicepharma.com>에서 확인하실 수 있습니다.



고려제약주식회사

경기도 이천시 신둔면 원적로 69-10