

가바틴® 캡슐

100밀리그램 / 300밀리그램 / 400밀리그램
가바펜틴

전문의약품
분류번호113

■ 원료약품 및 그 분량 : 이 약 1캡슐 중

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| 가바펜틴캡슐100밀리그램 | 유효성분 : 가바펜틴(USP) 100mg |
| 가바펜틴캡슐300밀리그램 | 유효성분 : 가바펜틴(USP) 300mg |
| 가바펜틴캡슐400밀리그램 | 유효성분 : 가바펜틴(USP) 400mg |
| 첨가제(타르색소) : 황색5호, 황색203호 | |
| 기타 첨가제 : 육수수전분, 탤크, 캡슐 | |

■ 성상

| |
|--|
| 가바펜틴캡슐100밀리그램 : 백색 또는 회백색의 분말 또는 과립이 들어있는 상·하부 백색의 경질캡슐제 |
| 가바펜틴캡슐300밀리그램 : 백색 또는 회백색의 분말 또는 과립이 들어있는 상·하부 미황색(연노랑)의 경질캡슐제 |
| 가바펜틴캡슐400밀리그램 : 백색 또는 회백색의 분말 또는 과립이 들어있는 상·하부 황색의 경질캡슐제 |

■ 효능·효과

| | |
|---|--|
| 1. 노진증 | 1) 단독요법(사례를 제외)으로 진단된 환자의 치료 포함) : 만 13세 이상 청소년 환은 성인에서의 2차적 전신증상을 동반하거나 동반하지 않은 단독요법 부분발작 |
| 2. 부가요법 : 만 3세 이상 어린이 혹은 성인에서의 2차적 전신증상을 동반하거나 동반하지 않은 부분발작 | |

■ 신경병증성 통증

■ 용법·용량

1. 노진증(Epilepsy)

| | |
|--|--|
| 1) 만 13세 이상 환자의 단독요법 및 부가요법 | 유지 용량을 가바펜틴으로서 900mg/day로 하기 위해 단계적 적정을 투여의 처음 3일에 걸쳐 다음과 같이 시행한다. |
| - 첫째날 : 이 약 300mg 캡슐을 1일 1회 투여는 이 약 100mg 1캡슐을 1일 3회 투여(가바펜틴 300mg/day) | |
| - 둘째날 : 이 약 300mg 캡슐을 1일 2회 투여는 이 약 100mg 2캡슐을 1일 2회 투여(가바펜틴 600mg/day) | |
| - 셋째날부터 : 이 약 300mg 캡슐을 1일 3회 투여는 이 약 100mg 3캡슐을 1일 3회 투여(가바펜틴 900mg/day) | |
| 혹은 위의 방법 외에 사용 용량으로 이 약 300mg 캡슐을 1일 3회 투여 할 수도 있다(가바펜틴 900mg/day). 가바펜틴으로서 1,200mg/day까지 증량될 수 있으며, 1일 총 투여량은 가바펜틴으로서 2,400mg을 초과할 수 없다(가바펜틴으로서 2,400mg/day과 관계없이 안전성 및 유용성을 대한 대처는 중분율이다.) | |

| | |
|----------------------------------|---|
| 2) 만 3세 이상 만 12세 이하 어린이에 대한 부가요법 | 유지 용량을 가바펜틴으로서 1회 kg 당 30mg/day로 하기 위한 단계적 적정을 투여의 처음 3일에 걸쳐 다음과 같이 시행한다. |
| - 첫째날 : 가바펜틴으로서 10mg/체중(kg) 투여 | |
| - 둘째날 : 가바펜틴으로서 20mg/체중(kg) 투여 | |

| | |
| --- | --- |
| 51) 신경증성 통증(제3차원성 통증)을 300mg/day 또는 헬액토실을 받고 있는 환자에서 1주일 동안 잠자리로 변화시키거나 한다. | |

<tbl_r cells="2" ix="1" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols

