

“숨” 소리가 다르다

일반 의약품
분류번호 132



나잘스프레이

■ 원료약품 및 그 분량 : 이 약 1mL 중

유효성분 : 히알루론산나트륨(EP) 0.25mg
덱스판테놀(USP) 20mg

첨가제(보존제) : 벤질코늄염화물 0.03mg

기타 첨가제 : D-소르비톨액, 에데트산나트륨수화물, 무수인산수소나트륨, 인산이수소나트륨일수화물, L-멘톨, 박하향, 정제수

■ 성상

일정량씩 분무되는 용기에 든 무색 투명하고 점조성이 있는 점비액제

■ 효능·효과

코점막 보습 및 보호

■ 용법·용량

1회 사용 시 1~2회 좌우 비강에 분무하며, 1일 3회 사용한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 이 약을 사용하지 말 것.

이 약 및 이 약에 포함된 성분(덱스판테놀 및 벤질코늄염화물 등)에 과민증을 보이는 환자

2. 다른 질병이 있거나 다른 약을 복용하고 있는 경우 이 약을 사용하기 전에 의사 또는 약사와 상의한다.

3. 민감하거나 자극이 나타날 경우 사용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.

4. 일반적 주의

- (1) 이 약은 코에만 사용하고 내복하거나 눈 및 귀에 사용하지 않는다.
- (2) 코에 적용하는 다른 제품을 함께 사용할 경우, 30분 이상의 간격을 두며 이 약을 마지막에 사용한다.
- (3) 오염을 방지하기 위해 될 수 있는 한 공동으로 사용하지 않고 사용 후 용기를 덮고 뚜껑을 닫는다.
- (4) 어린이에 사용할 경우 보호자의 지도 감독 하에 사용한다.
- (5) 이 약은 벤질코늄염화물을 함유하고 있어 기관지 경련을 일으킬 수 있으며, 특히 장기간 사용 시 비강 내 자극이나 종창(부기), 비강 점막의 부종을 유발할 수 있다.

5. 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- (2) 직사광선을 피하고 되도록 서늘한 곳에 보관한다.
- (3) 오염을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.
- (4) 개봉 후 12주 이상 사용하지 말 것.

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

■ 포장단위 : 15mL

■ 첨부문서 최종개정일 : 2022년 02월 01일

■ 제조자 : (주)제뉴원사이언스 세종특별자치시 전의면 산단길 245

■ 제조의뢰자 : 고려제약(주) 경기도 이천시 신둔면 원적로 69-10

※ 본 의약품은 우수약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

21-10-20-C

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 ※ 사용전에 첨부문서를 꼭 읽으십시오.
 ※ 기타 문의사항은 의·약사와 상의하거나 당사의 소비자 상담실 080-529-6100로 문의하십시오.
 ※ 첨부문서 최종 개정일 이후의 변경사항은 <http://www.nicepharma.com>에서 확인하실 수 있습니다.


— 뒷면에 사용방법을 참고하십시오. —




고려제약주식회사
경기도 이천시 신둔면 원적로 69-10

◆ 사용방법 ◆

사용 전에 용법·용량과 사용법을 충분히 숙지하십시오.




1. 고정핀을 빼고 뚜껑을 여십시오.



2. 처음 사용할 때에 약액이 잘 분사되는지 확인하기 위해 그림과 같이 병을 쥐고, 검지와 중지로 펌프를 눌러주어 균일하게 분사되는지 확인하십시오.



3. 제품 윗쪽 부분을 한쪽 코에 넣고 짧게 1~2회 분무하십시오.
내용물이 한쪽 코로 다시 흘러나오거나 양쪽 코로 나올 수 있습니다.
다른쪽 코에도 같은 방법으로 분무하십시오.
(사용 후 용기 윗쪽 부분을 깨끗이 닦아주십시오.)



4. 고정핀을 꽂고 뚜껑을 닫으십시오.