

고단위 생약성분의 면역증진제

이뮤-골드액

에 키 나 시 아 액 스

일반의약품
분류번호 229

- **원료약품의 분량** : 이 약 100g 중
 유효성분 : 에키나시아엑스(별규) 1,170mg(시코린산으로서 35.1mg)
 첨가제(보존제) : 소르빈산칼륨 267mg
 기타 첨가제 : 백당, 농글리세린, 시트르산수화물, 시트르산나트륨수화물, 효소처리스테비아, 베타덱스, 레몬엑센스 (SK-36620), 오렌지엑센스(O-8083), 정제수

■ **성상** : 갈색 바이알에 든 생약특유의 향과 맛이 있는 미황색(연노랑)내지 황갈색의 액

■ **효능·효과** : 재발성 기도감염의 보조요법

■ **용법·용량**

1. 성인 및 12세 이상 소아 : 에키나시아엑스로서 1회 117mg(1병)을 1일 3회 복용한다.
2. 6세 이상 12세 미만 소아 : 이 약으로서 1회 117mg(1병)을 1일 2회 복용한다.
3. 4세 이상 6세 미만 소아 : 이 약으로서 1회 58.5mg(1/2병)을 1일 3회 복용한다.

■ **사용상의 주의사항**

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응이 있는 사람
 - 2) 결핵, 백혈병, 교원질증, 다발성 경화증 만성사르코이드증, 만성비리루스질환, AIDS, HIV감염, 기타 자기면역 질환 등의 전신질환이 진행중인 환자
 - 3) 4세 미만 소아
 - 4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
2. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 피부 : 충혈되어 붉어짐, 가려움 등의 과민반응이나 드물게는 피부 부기 증상이 나타날 경우
 - 2) 호흡기계 : 호흡곤란, 발열, 화농성 및 출혈이 있는 가래가 나오거나 지속될 경우
 - 3) 순환기계 : 어지럼, 저혈압 등의 증상이 나타날 경우
3. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

8주이상 계속 복용하지 말 것.
4. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.
 - 3) 개봉 후 8주 동안 안정함.

■ **저장방법** : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 (사용기간 : 제조일로부터 36개월)

■ **포장단위** : 10g×1병, 10g×30병, 10g×60병

■ **첨부문서 최종 개정일** : 2019년 09월 05일

※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 의품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223)

20-7-21-E

- ※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 ※ 사용전에 첨부문서를 꼭 읽으십시오.
 ※ 기타 문의사항은 의·약사와 상의하거나 당사의 소비자 상담실 080-529-6100로 문의하십시오.
 ※ 첨부문서 최종 개정일 이후의 변경사항은 <http://www.nicepharma.com>에서 확인하실 수 있습니다.



고려제약주식회사
 경기도 이천시 신문면 원적로 69-10