

# 더마크린 에취씨 1% 로션

## 히드로코르티손

일반의약품  
분류번호 264

### ■ 원료약품 및 그 분량 : 이 약 100g 중

유효성분 : 히드로코르티손(KP) ..... 1g

첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸 72mg, 파라옥시벤조산프로필 8mg

기타 첨가제 : 나트륨피씨에이액, 락트산, 세탄올, 스테아릴알코올, 유동파라핀, 백색바셀린, 프로필렌글리콜, 폴리에틸렌 글리콜400, 폴리소르베이트80, 소르비탄모노스테아레이트, 수산화나트륨, 아카시아하행(SP-42106), 정제수

### ■ 성상 : 백색의 로션제

### ■ 효능·효과 : 습진·피부염군, 피부가려움, 벌레물린데

### ■ 용법·용량 : 사용 전 잘 흔들어 섞은 후 1일 1~3회 적당량을 환부(질한 부위에 바르고 증상에 따라 적절히 증감한다.

### ■ 사용상의 주의사항

#### 1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 세균(결핵, 매독 등)·진균(곰팡이)·칸디다증, 백선(무좀 등)·바이러스(대상포진(물집), 단순포진(물집), 수두, 풍두증 등)·동물음, 사면발이 등성 피부감염증 환자(증상이 악화될 수 있다.)
- 2) 이 약 또는 이 약 성분에 과민증 및 그 병력이 있는 환자
- 3) 고막 천공(뚫림)이 있는 습진성 외이도(바깥귀)염 환자(천공(뚫림)부위의 치유지연이 나타날 수 있다.)
- 4) 케양베테르병 제외), 제2도 심재성(드러나지 않는) 이상의 화상·동상 환자(피부재생이 억제되어 치유가 지연될 수 있다.)
- 5) 입 주위 피부염, 보통여드름, 주사 환자, 비염증성 기려움 환자

#### 2. 다음 환자에는 신중히 사용할 것.

- 1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부
- 2) 유·소아(특히, 2세 미만 유아의 경우 의사와 상담할 것)
- 3) 고령자(노인)
- 4) 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

#### 3. 이상반응

##### 1) 피부

- (1) 감염증 : 피부의 세균성(전염성 농가진(고름딱지증), 모낭염 등) 및 진균(곰팡이)성(칸디다증, 백선(무좀 등)) 감염증이 나타날 수 있다.[밀봉봉대법(ODT)의 경우 및 따뜻하고 습한 상태의 접힌 피부의 경우 나타내기 쉽다.] 이와 같은 증상이 나타날 경우에는 적절한 항균제나 항진균(항곰팡이)제 등을 병용(함께 사용)하고 증상이 신속히 개선되지 않을 경우에는 사용을 중지한다.
- (2) 일반적 피부증상 : 모낭염, 부스럼, 피부자극, 자통(찌르는 것 같은 아픔), 발열, 적열감(화끈감), 발진, 발적(종혈 되어 붉어짐), 홍조(붉어짐), 가려움, 피부건조, 농포(고름물집)성피부염, 알레르기성 접촉피부염, 딱피, 한진(딱피), 상처악화, 욕창, 농포(고름물집)증 등이 나타날 수 있으며, 이러한 증상이 나타날 경우에는 사용을 중지한다. 두드러기, 피부발달, 색소침착 변화, 적용 부위 자극/통증, 본 증상의 악화가 매우 드물게(1/10,000) 보고되었다.
- (3) 장기 연용(계속 사용) : 스테로이드성 여드름, 스테로이드성 피부피부부위, 모세혈관확장, 자반(자주색 반점), 스테로이드성 주사, 입주위피부염(입주위·안면(얼굴)전체에 홍반(붉은 반점), 구진(눈물림), 모세혈관확장, 딱지, 인설(겉짐), 어린선(魚鱗)양 피부변화, 다모(털과다), 색소탈실, 선조(튼살), 수포성피부염, 아토피피부염, 피부출혈 등이 나타날 수 있다. 이러한 증상이 나타날 경우에는 천천히 사용량을 줄여 코르티코이드를 함유하지 않은 약으로 바꾸어 사용한다.

##### 2) 면역계 : 국소 과민증이 매우 드물게(1/10,000) 보고되었다.

- (3) 내분비계 : 대량 또는 장기간에 걸친 광범위한 사용, 밀봉봉대법에 의해 코르티코이드 전신 투여와 같은 뇌하수체·부신(공팔위샘)피질계 기능의 억제를 가져올 수 있으므로 주의한다. 시상하부-뇌하수체-부신(HPA) 축의 억제(체중 증가/비만, 소아에게 있어 체중 증가 억제/성장 지체, 쿠싱신드롬 증생(얼굴부종, 복부비만), 내인성 코르티솔 수치 감소, 고혈당증/당뇨, 고혈압, 골다공증, 백내장, 녹내장, 스테로이드 금단현상)가 매우 드물게(1/10,000) 보고되었다.
- 4) 눈 : 안검(눈꺼풀)피부에 사용시 안(눈)의 상승, 녹내장을 일으킬 수 있으므로 주의한다. 대량 또는 장기간에 걸친 광범위한 사용, 특히 밀봉봉대법을 사용할 경우 후낭하백내장, 녹내장 등이 나타날 수 있다. 빈도불명의 시야흐림 이 나타날 수 있다.

#### 4. 일반적 주의

- 1) 피부 감염을 수반하는 습진·피부염에는 사용하지 않는 것을 원칙으로 하지만 부득이하게 이 약을 사용하는 경우에는 먼저 적절한 항균제(전신적용), 항진균(항곰팡이)제로 치료하거나 이들과의 병용(함께 사용)을 고려한다. 감염 부위가 확산되면 국소 코르티코스테로이드 요법을 중단하고 적절한 항균요법을 실시한다.
- 2) 국소 코르티코이드의 전신적 흡수는 몇몇 환자에서 당질코르티코스테로이드 결핍의 원인이 되는 가역적인 시상하부-뇌하수체-부신(공팔위샘(HPA) 축)의 억제, 고코르티솔혈증의 징후(쿠싱증후군, 과혈당증), 당뇨 등을 일으킬 수 있으므로 국소 코르티코이드를 광범위한 체표면 또는 밀봉봉대법 하에 사용하는 환자는 정기적으로 혈중 코르티솔 농도, 요중에 유리되는 코르티솔을 측정하거나 ACTH 자극시험을 하여 HPA축 억제를 검사한다.
- 3) 국소 코르티코이드의 전신적 흡수 증가로 인해 HPA축이 억제되어 위 증상이 발견된 경우 투여 빈도를 줄이거나, 활성이 약한 코르티코스테로이드로 대체함으로써 이 약물을 서서히 중단한다. 약물의 갑작스런 중단은 당질코르티코스테로이드 결핍의 이상반응을 일으킬 수 있다. 일반적으로 국소 코르티코이드 약물투여 중지 후 HPA축 기능은 신속히 회복된다.
- 4) 증상이 개선되지 않거나 악화되는 경우에는 사용을 중지한다.

- 5) 증상이 개선되면 가능한 한 빠른 시일 내에 사용을 중지한다.
  - 6) 이 약의 치료기간은 7일 이내로 제한한다.
  - 7) 운전이나 기계조작 능력에 이 약이 미치는 효과는 연구된 바 없으나 이 약의 약리작용으로부터 이러한 능력의 손상이 예측되지는 않는다.
  - 8) 전신 및 국소 코르티코스테로이드 사용으로 시력장애가 보고될 수 있다. 환자에게 시야흐림 또는 기타 시력장애와 같은 증상이 나타날 경우, 환자를 안과의사에게 보내어 백내장, 녹내장 또는 전신 및 국소 코르티코스테로이드 사용 후 보고된 중심장액맥락암반병(CSC)과 같은 희귀질환을 포함하여 발생 가능한 원인 평가를 고려해야 한다.
- 5. 임부 및 수유부에 대한 투여**
- 1) 생식능력  
사람에서의 생식능력에 대한 국소 히드로코르티손의 영향을 평가한 자료는 없다.
  - 2) 임부
    - ① 동물실험에서 비교적 적은 용량의 코르티코이드를 전신적으로 투여한 경우, 좀 더 강력한 코르티코이드 피부 도포로 인해 기형 발생이 나타났다.
    - ② 임부에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 모체에 대한 치료상의 유익성이 태아에 대한 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 이 약을 투여한다. 이 경우 최소의 기간 동안 최소용량만 투여하여야 한다.
  - 3) 수유부
    - ① 이 약이 모유로 이행한다는 보고는 없으나 전신적으로 흡수된 코르티코이드가 모유 중으로 이행되므로 수유부에 투여 시 주의한다.
    - ② 수유부에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 수유부에 대한 치료상의 유익성이 영아에 대한 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
    - ③ 수유 중 이 약을 사용하는 경우, 영아가 사고로 섭취하는 것을 피하기 위해 가슴부위에 사용하지 않는다.
- 6. 소아에 대한 투여**
- 1) 12살 미만의 유·소아에게는 부신 억제제가 더 많이 일어날 수 있으므로 장기간 연속적인 국소 요법은 가능하면 피한다.
  - 2) 소아는 체중당 체표면적의 비율이 성인보다 크고, 피부장벽이 미성숙하여 성인에 비해 비례적으로 더 많은 양이 흡수되어 HPA축 억제, 쿠싱증후군, 발육장애 등이 나타나기 쉬우므로 주의한다.
  - 3) 기저귀 등은 밀봉붕대법과 같은 작용을 나타낼 수 있으므로 주의한다.
- 7. 고령자(노인)에 대한 투여**
- 일반적으로 고령자(노인)에서는 부작용이 나타나기 쉬우므로 대량, 장기간, 광범위하게(특히 밀봉붕대법) 사용할 경우 충분히 관찰하는 등 주의한다.
- 8. 과량 투여 시의 처치**
- 국소적으로 투여된 히드로코르티손이 많은 양 흡수 되어 전신효과를 일으킬 수 있다. 급성 과량투여는 거의 발생하지 않으나, 만성 과량투여 또는 오용(잘못 사용)의 경우, 고코르티솔혈증의 증상이 나타날 수 있다. 임상적 지시에 따라 추가적으로 관리한다.
- 9. 적용상의 주의**
- 1) 안과용으로 사용하지 않는다.
  - 2) 화상이나 면도 후 등 치료 이외의 목적으로 사용하지 않는다.
  - 3) 의사의 감독 없이 밀봉붕대법을 사용하지 않는다.  
(특히 밀봉붕대법을 사용할 경우 세균감염이 나타나기 쉬우므로 적용 전에 환부(질환부위)를 청결히 한다.)
  - 4) 얼굴은 위축성 변화에 더욱 민감하므로 장기 투여하지 않는다.
- 10. 저장상의 주의사항**
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 11. 기타**
- 건선(마른비늘증)환자에 장기간, 대량 사용한 경우 치료 중 또는 치료종지 후 건선(마른비늘증)성홍피증(홍색 피부증), 농고(고름물집)성건선(마른비늘증) 등이 나타났다는 보고가 있다.

■ **저장방법**: 기밀용기, 15~30°C 보관 (사용기간: 제조일로부터 24개월)

■ **포장단위**: 60밀리리터/병, 100밀리리터/병

■ **첨부문서 최종 개정일**: 2020년 12월 16일

■ **제조사**: (주)제뉴원사이언스 세종특별자치시 전의면 산단길 245

■ **제조의뢰자**: 고려제약(주) 경기도 이천시 신둔면 원적로 69-10

※ 스테로이드 성분이 함유되어 있으므로 오·남용에 주의하십시오.

※ 본 의약품은 우수약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청: 한국약품안전관리원(1644-6223)

21-5-C

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.  
 ※ 사용전에 첨부문서를 꼭 읽으십시오.  
 ※ 기타 문의사항은 의·약사와 상의하거나 당사의 소비자 상담실 080-529-6100로 문의하십시오.  
 ※ 첨부문서 최종 개정일 이후의 변경사항은 <http://www.nicepharma.com>에서 확인하실 수 있습니다.



**고려제약주식회사**  
 경기도 이천시 신둔면 원적로 69-10